

对COVID-19疫苗相关问题的可信解答

2021年5月25日

四种COVID-19疫苗已获准在加拿大使用，世界各地已有上亿人接种了这些疫苗。本公告对有关疫苗的常见关切和问题进行了解答，以便您在接种COVID-19疫苗时能够获得相关的有用信息。本公告中的信息已经过医生和研究人员的验证。



患有过敏的人士可否接种疫苗？

可以，即使您对不同的食物、药物或其他成分有严重的过敏反应史，接种COVID-19疫苗也是安全的。如果您有严重的过敏反应史，请在接种疫苗后于接种中心内等待30分钟，以确保一切正常。在出现罕见过敏反应的情况下，现场始终会有医务人员为您提供支持。如果您曾对COVID-19疫苗的某一特定成分严重过敏（例如聚乙二醇[PEG]或聚山梨酸酯）或对COVID-19疫苗的第一剂过敏，您应该与医护人员讨论如何安全地接种疫苗。请注意，这些特定的过敏现象是非常罕见的。



患有其他医疗病症的人士可否接种疫苗？

如果您有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘或贫血等疾病，仍可以安全地接种疫苗。如果您有特定的健康状况或正在服用削弱免疫系统的药物（免疫抑制性疾病或免疫抑制药物，如化疗或大剂量的类固醇药物等）或患有自身免疫性疾病，请与医疗人员沟通，以决定何时接受疫苗最好。



是否应等待大部分人都施打疫苗？

不要等待。一旦轮到您，请立即接种疫苗。它能保护您不会因COVID-19而出现重症或死亡。截至5月25日，全世界已施打超过10亿剂的COVID-19疫苗。为了结束疫情，大多数人都需要接种疫苗；越早接种疫苗，社区就越安全。



疫苗的保护效力可持续多久？

研究人员仍在试图确定疫苗防护力的确切时长。您可能需要在未来接种加强剂，以继续保护您免于感染COVID-19病毒。

COVID-19疫苗分一剂或两剂注射，取决于疫苗类型。如果您接种的是两剂型疫苗，您需要在之后注射第二剂。完整接种两剂才能更全面地保护您不会因COVID-19出现重症或死亡。

记住：即使在接种疫苗后，您也应继续遵守所有COVID-19的公卫防疫措施，如戴口罩、与他人保持距离、勤洗手等。

疫苗可以保护您和亲友免受COVID-19侵袭。接种疫苗的人越多，公众受到的保护也就越多！



我们希望这份公告对您有所助益！我们邀请您广为分享，用它作为录制音频或视频文件的脚本，或将它翻译成更多语言与他人分享。请务必注明出处：女子学院医院（Women's College Hospital）、OCASI、TAIBU社区卫生中心和Refugee 613组织。

资料截至2021年5月25日

本公告中的信息已经过加拿大医生的验证：医学博士Meb Rashid，多伦多大学助理教授；医学博士Vanessa Redditt，多伦多大学讲师；医学博士Isaac I. Bogoch，多伦多大学副教授


{ REFUGEE } 613

BE IN GOOD HEALTH
TAIBU
COMMUNITY
HEALTH CENTRE

OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCHI
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Healthcare | REVOLUTIONIZED

Funded by:

 Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

联合制作:

pchs 30
Serving Diverse Communities

 Occupational Health
Clinics for Ontario
Workers Inc.

