



Qué puede esperar en los siguientes días:

Posibles efectos secundarios que podrían presentar los niños o los adultos

Los efectos secundarios son comunes uno o dos días después de recibir la vacuna contra la COVID-19. Estos pueden incluir:



Dolor, enrojecimiento, comezón o hinchazón de inmediato o 7 días después



Ganglios linfáticos inflamados debajo de la axila




Cansancio o dolor de cabeza



Fiebre y escalofríos



Dolor muscular o en las articulaciones



Náusea y vómito

CONSEJOS PARA LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Áreas adoloridas: aplique un paño frío y húmedo o una bolsa de hielo envuelta.

Malestar debido a los efectos secundarios: tome medicamentos como el paracetamol (Tylenol®) o el ibuprofeno (Advil®). No debe administrarse AAS (p. ej., Aspirina®) a ninguna persona menor de 18 años de edad. Si está embarazada, no tome ibuprofeno (Advil®). Mejor trate el malestar o la fiebre con Tylenol®.

La mayoría de los efectos secundarios no son graves y deben desaparecer por sí solos.

Esté al pendiente de estos síntomas

- Algunos de los efectos secundarios de la vacuna son similares a los síntomas de COVID-19. La vacuna NO puede causarle ni transmitirle la COVID-19.
- Los síntomas tales como dolor de garganta, escurrimiento nasal o tos NO son efectos secundarios de la vacuna.
- Si presenta CUALQUIER síntoma de COVID-19, permanezca en casa hasta que se sienta mejor y solicite atención médica urgente si los síntomas se intensifican.
- Si está preocupado/a, comuníquese con su proveedor de atención médica o llame al 8-1-1.
- Es raro que se produzcan efectos secundarios graves después de recibir la vacuna. Si presenta algún efecto secundario grave o una reacción alérgica grave (lo que incluye urticaria, hinchazón del rostro, la lengua o la garganta, o dificultad para respirar) busque atención médica o llame al **9-1-1** de inmediato. Infórmeles que recibió una vacuna contra la COVID-19.

Cuándo regresar por su siguiente dosis

- A las personas que ya hayan recibido por lo menos una vacuna se les notificará por correo electrónico, texto o teléfono cuando reúnan los requisitos para programar una cita para su siguiente dosis. Asegúrese de registrarse en "Get Vaccinated" en gov.bc.ca/getvaccinated. Puede registrarse en cualquier momento, incluso si ya recibió una vacuna.
- Lleve con usted su registro de vacunación. También habrá un registro en línea disponible en el portal sanitario "Health Gateway". Regístrese en www.healthgateway.gov.bc.ca

Lo que debe recordar

- Por lo general, es necesario que pasen dos semanas para que se produzca inmunidad contra el virus después de cada dosis. Si se expone a alguien con COVID-19 antes o durante este periodo de tiempo, podría contraer COVID-19. Tendrá una mejor protección una vez que reciba todas las dosis recomendadas.
- Es posible que alguien se comuniquen con usted para que participe en un programa de monitoreo de seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Para obtener más información, vaya a canvas-covid.ca

Siga cumpliendo con las pautas de salud pública después de recibir la vacuna



Límpiese
las manos
frecuentemente



Utilice un
cubrebocas

Eventos poco comunes después de recibir una vacuna

Si presenta cualquiera de estos síntomas:

- 1 Busque atención médica de inmediato
- 2 Lleve con usted su registro de vacunación contra la COVID-19

Vacuna de AstraZeneca/COVISHIELD o Janssen

Se han informado casos poco comunes de sangrado o coágulos sanguíneos graves.

Esté pendiente de lo siguiente de 4 a 28 días después de recibir la vacuna:

- Dolor de cabeza intenso que no desaparece
- Convulsión
- Dificultad para mover una parte del cuerpo
- Visión borrosa que no desaparece
- Dificultad para hablar
- Falta de aliento
- Dolor de pecho
- Dolor abdominal intenso
- Nueva hinchazón, dolor o cambio de color intensos en un brazo o una pierna
- Moretones anormales, manchas rojizas o púrpuras, o ampollas de sangre debajo de la piel

Vacuna de Pfizer o Moderna

Se han informado casos poco comunes de inflamación cardíaca.

Esté pendiente de lo siguiente 7 días después de recibir la vacuna:

- Dolor en el pecho
- Falta de aliento
- Sensación en el corazón de latidos rápidos, palpitaciones o latidos fuertes que no desaparece con reposo o que está acompañada de otros síntomas